



Ottava Giornata della Ricerca della Svizzera Italiana

Venerdì 9 marzo 2018

Modulo per la sottomissione abstract di ricerca CLINICA

Titolo (massimo **15 parole**)

Una fotografia del soccorso nel Canton Ticino. L'esperienza nella dissezione aortica di tipo A

Autori (cognome e iniziali, es: Grassi L.)

Grego S., Pedrazzini G., Moccetti T., Demertzis S.

Affiliazioni (ospedale o istituto, servizio o reparto, indirizzo, es: Ospedale Regionale di Lugano, Servizio di angiologia, Lugano)

Cardiocentro Ticino, Servizi di Cardiologie e Cardiocirurgia, Lugano.

Testo (massimo **250 parole**, preferibilmente in italiano (accettato anche in inglese), suddiviso in Introduzione, **Metodi**, **Risultati**, **Conclusioni** e **Finanziamento**)

Introduzione: La dissezione dell'aorta ascendente è un evento imprevisto e frequentemente imprevedibile. La mortalità, elevata, è correlata al tempo che intercorre tra l'evento e l'intervento cardiocirurgico.

Metodi: Studio retrospettivo di pazienti soccorsi nel Canton Ticino e sottoposti ad intervento per dissezione dell'aorta ascendente tipo Stanford A (AADA) (CE 3121, BASEC 2016-01812).

Risultati: dal gennaio 2001 al dicembre 2016 gli interventi effettuati per dissezione spontanea dell'aorta ascendente sono stati 117. Il 97% dei pazienti (113/117) è stato soccorso nell'area del Canton Ticino, 4 pazienti provenivano dall'ospedale di Samedan (GR).

Tra i pazienti soccorsi nel Cantone, la diagnosi di dissezione è stata formulata nel 23% dei casi a Locarno, nel 16% dei casi a Bellinzona, nel 51 % a Lugano e nel 7% dei casi a Bellinzona.

Il tempo intercorso tra la diagnosi e l'ingresso in sala operatoria è stato mediamente di 84 ± 41 minuti, 86 ± 23 minuti da Locarno, 110 ± 36 minuti da Bellinzona, 72 ± 43 minuti da Lugano e 95 ± 27 minuti da Mendrisio.

Conclusioni:

La rete di soccorso del Canton Ticino consente intervalli di tempo eccezionalmente brevi rispetto ai dati fino ad ora pubblicati. I fattori che portano a questo risultato sono molteplici, tra cui la consapevolezza della dissezione dell'aorta come una delle cause del dolore toracico acuto, la disponibilità di metodi diagnostici (TAC) in urgenza con tempestiva condivisione delle immagini con la cardiocirurgia e l'efficienza della rete primaria di soccorso.

Finanziamento: Fondazione Cardiocentro Ticino

Visto superiore (prego indicare Nome e Cognome del superiore)

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis

Criteria per sottomissione Abstract:
NO Case report
NO Abstract senza nessun risultato
VISTO da un superiore

Invio Abstract

